NUMÉRO 2 OCTOBRE 2026

LES ACTUS DE LA COULÉE VERTE

ENVIRONNEMENT | PRAIRIE | PAPILLONS | GUÉHENNO

LES AZURÉS S'ÉCLATENT DANS LA PRAIRIE SÈCHE

Après cet **été** particulièrement **caniculaire**, **la prairie sèche** qui comprend les **arbres fruitiers** plantés par les enfants de la commune, **a totalement changé** d'aspect, **passant** d'**espace fleuri** au printemps à un **stade d'herbes sèches** d'aspect quelque peu désolant.

Pourtant, un **passage** effectué en **début de mois de septembre** a permis de relever **un papillon peu courant** dans le secteur, à savoir **l'azuré du trèfle** (photos 1, 2,3,). Plusieurs individus ont été observés dans les herbes sèches, ce qui traduit la **présence d'une petite population** qu'il conviendra de suivre dans les années à venir et qui demandera sans doute un mode de gestion assez pointu sur ce petit terrain.


D'autre part, **une autre espèce est présente** sur le même terrain (et du côté des mares également), mais qui est **bien plus courante** que le précédent : il s'agit de l'**azuré commun** (photos 4, 5, 6) qui est un **papillon tardif** (jusque mi-novembre) et qui **profite des repousses de plantes fauchées** au printemps, **des chardons non fauchés**, et d'**autres plantes qui se sont développées** avec le retour de quelques **jours pluvieux** après la canicule du mois d'août.





1 **Azuré du trèfle** – mâle – *cupido argiades* –
Se reconnaît à la « petite queue » en bordure de l'aile postérieure. C'est un des plus petits papillons de France





2 **Azuré du trèfle** – femelle
Est plus sombre que le mâle, mais présente aussi « la petite queue » en bordure des ailes.
Il y a 2 générations par an

Azuré du trèfle



Zoom



Azuré commun



3 **Azuré du trèfle** – mâle
Cette vue de côté montre la présence de 2 petites taches orangées , significatives de l'espèce également.

4 **Azuré commun** – mâle – *polyommatus icarus*
Ce papillon est plus grand que le précédent, et surtout plus abondant

Azuré commun



5 **Azuré commun** – (aussi appelé azuré de la bugrane)
Ce mâle est posé sur une fleur de lotier, qui est une des plantes servant de ponte à l'espèce

Azuré commun



Fleur de lotier



6 **Azuré commun** – femelle
Comme pour l'espèce précédente, la femelle est plus terne, mais l'autre face des ailes est très proche des couleurs des mâles
En général, cette espèce présente 3 générations annuelles

Accouplement



(ici, dans une lande, sur une bruyère fanée)

Zoom



La ponte



La femelle pond plusieurs dizaines d'œufs, sur des feuilles de végétaux, comme les lotiers, trèfles, etc.

La chenille à l'éclosion des œufs



Des chenilles se mettent à dévorer les feuilles de la plante-hôte, et grandissent en effectuant plusieurs mues




Après la dernière mue, les chenilles se transforment en nymphe : c'est une sorte de cocon qui va permettre de passer l'hiver invisible dans la végétation basse ; aux beaux jours de l'année suivante, un nouveau papillon apparaît, soit mâle, soit femelle (ici, un mâle sur un ajonc)

Le saviez- vous ? La légende d'Icare

L' **azuré** commun , comme beaucoup de papillons, **doit son nom latin à un personnage de la mythologie grecque.**
En effet , **polyommatus icarus** , cela renvoie tout de suite à un personnage célèbre dans les récits antques : il s'agit d'I**care, le fils d'un architecte nommé Dédale** qui était au service d'un roi athénien.
Mais à la suite de t**rahisons répétées, Dédale et son fils se trouvent enfermés dans un étrange labyrinthe** dont ils ne peuvent sortir
En **observant les oiseaux** , ils ont alors l'idée de se **confectionner des ailes** en assemblant des grandes plumes avec de la cire. Mais **Dédale** met son fils en garde , lui **interdisant de s'approcher trop près de la mer à cause de l'humidité, et du soleil , à cause de la chaleur. Icare s'envole** dans les airs et retrouve sa liberté ; il en est tellement grisé qu'il s'élève peu à peu et **s'approche de plus en plus du solei**l , **ce qui fait fondre... la cire de ses ailes !** Il **tombe dans la mer qui depuis porte son nom** : la mer icarienne.



CYCLE DE VIE DES AZURÉS DU SERPOLET




Source : Plan National d'Actions Maculinea - OPIE

Gagnant – gagnant

Dans la nature , il est fréquent que des **espèces coopèrent pour survivre** : c'est le **cas pour certains papillons** (les azurés surtout) qui vont avoir **recours aux fourmis** pour achever leur cycle de développement dans les meilleures conditions.

1, 2, et 3 - Étapes **valables pour tous les papillons** : **butinage**, puis **ponte** et **naissance** d'une **chenille** (plutôt verte que rose en général !!!).
4 - En **fin de croissance**, la **chenille** se laisse **tomber au sol** , et va être **prise en charge** par une ou plusieurs **fourmis** qui vont la **transporter** jusqu'à leur **fourmilière,** sous terre.
5 - La chenille est à l'abri pour l'hiver, et rentre plus ou moins en hibernation : mais les **fourmis continuent d'être actives et de temps en temps, elles tapotent sur le dos de la chenille**, qui réagit en **produisant** une sorte de **miellat,** ce qui va permettre de nourrir les larves des fourmis.
En fin de compte, tout le monde est gagnant !
6 - La chenille s'est peu à peu transformée en **chrysalide**; à la belle saison, les **fourmis la placent tout près d'une sortie** de la fourmilière et la **métamorphose** pourra avoir lieu, pour donner naissance au **nouveau papillon** (dessin 7).





Yves Thoron

L'ABB

(association brévelaise pour la biodiversité) propose une formation à tous ceux qui désirent mieux connaître la nature de la région : plantes, oiseaux , insectes, etc. Cela se décline par une séance en salle (dernier mardi de chaque mois, à 20h15 à salle de la Claie à St-Jean), ainsi qu'une sortie sur le terrain (le samedi suivant en général) Renseignements au 06 74 96 13 11

Retrouvez toutes les infos de l'ABB sur Facebook

